

藥物成分	劑型	櫃號
<b>Carbidopa / Levodopa</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／櫃號：2023-270		

## ☞ 藥品商品名及含量

**瑞多寧緩釋膠囊 48.75/195 毫克 (Numient E.R.)**

## ☞ 藥品作用


治療帕金森氏症及相關徵候群，改善運動困難、震顫及肢體僵硬等症狀。

## ☞ 服用方式

1. 本藥每日劑量需根據臨床反應做出個人化調整，請遵照醫師指示調整劑量。
2. 需要整顆吞服，**不要咀嚼或壓碎膠囊**。針對吞嚥困難的患者，可以小心打開膠囊，將完整內容物撒在少量軟性食物上，並立即將全部混合物不經咀嚼吞嚥完畢。
3. 與食物併服不影響藥效，但高蛋白飲食會降低本藥吸收，進而影響藥效，故請避免和高蛋白飲食一起服用。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是窄角性青光眼、嗜鉻細胞瘤、黑色素瘤及橫紋肌溶解症病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑。
3. 本藥不可與非選擇性單胺氧化酶抑制劑併用，且須在停止服用後至少 2 週才可開始使用本藥。
4. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

- 
5. 常見副作用為噁心嘔吐、便秘、腹瀉、頭暈、嗜睡、幻覺、夢境異常、姿勢性低血壓、尿液變色、皮膚過敏等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
  6. 長期服用本藥，建議定期評估肝臟、腎臟、造血與心血管功能。
  7. 懷孕等級 C，目前對胎兒風險不明，資料顯示動物實驗中有生殖毒性紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
  8. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。