



藥物成分

Diltiazem

劑型

口服藥

櫃號

版本：TPE202309／檔號：2023-572

☞ 藥品商品名及含量

卡迪爾錠 30 毫克/錠 (Cartil)

迪心贊錠 30 毫克/錠 (Diltisser)

合必爽錠 30 毫克/錠 (Herbesser)

凱帝心徐放錠 90 毫克/錠 (Cardizem Retard)

保樂康緩釋膠囊 180 毫克/膠囊 (Progor)

能得爽緩釋膠囊 120 毫克/膠囊 (Nakasser SR cap 120mg)

☞ 藥物作用

1. 狹心症 2. 高血壓。

☞ 服用方式

1. Diltiazem 有一般劑型與緩釋劑型。

2. 一般劑型通常一日 3 次，每次 1 到 2 粒。緩釋劑型通常一日 1 到 2 次，每次 1 到 2 粒。需整粒吞服，不可嚼碎/剝半/或研磨。

3. 醫師可能依照您的臨床症狀調整使用頻率和劑量，請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘記服藥，請立即補服，但若已接近下次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告知您的醫師，是否有藥品過敏史及您目前正在服用的其它藥物，特別是心臟用藥或血壓用藥，例如：乙型交感神經接受體阻斷劑、強心劑、抗心律不整藥物及利尿劑等。

2. 如果您有或曾經有腎臟、心臟或肝臟疾病，應告知您的醫師。

3. 不建議用於懷孕或即將懷孕的婦女，故就診時請務必告知醫師是否計畫懷孕或已懷孕。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。本藥可能會分泌到乳汁中，若有哺乳需求請

事先諮詢醫師/藥師。

4. 常見的副作用是頭痛、潮紅、水腫、眩暈及心悸，副作用通常為暫時性，並在持續服用相同劑量後消失。
5. 若您有下列任一症狀：胸痛、心跳不規律、皮膚紅疹、不尋常的疲勞或虛弱、氣喘或呼吸困難等持續數日或逐漸惡化時請立即停藥並就醫或與醫師連絡。