

藥物成分

劑型

櫃號

Mefenamic acid

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-661

☞ 藥品商品名及含量

痛疏達膠囊 250 毫克/膠囊 (Ponstal Capsules)

痛立惠膠囊 250 毫克/膠囊 (Tonifen Capsules)

☞ 藥品作用

解熱、鎮痛、消炎。

☞ 服用方式

1. 通常一日 4 次，每次 1 粒。
2. 14 歲以下孩童不建議使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是消化性潰瘍、胃腸出血、阿斯匹靈(aspirin)、非類固醇消炎止痛藥(NSAID)引發之氣喘或鼻炎、心血管或肝腎疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他非類固醇消炎止痛藥(NSAID)藥物、抗凝血藥物、抗血小板藥物、血管收縮素轉化酶抑制劑(ACE Inhibitors)或血管收縮素受體阻斷劑(ARB)等抗血壓藥物、銀杏萃取物(ginkgo biloba)。
3. 進行冠狀動脈繞道手術之後 14 天內禁用本藥。
4. 常見副作用為皮膚搔癢、皮疹、腸胃道不適、噁心、嘔吐、頭痛、頭暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：史蒂文生強生症候群（皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、

肌痛或噁心嘔吐等)、消化道出血(腹痛、解鮮紅色或黑便、吐血或咖啡色渣、虛弱、呼吸困難等)、心臟疾病急性發作或中風(胸痛、呼吸短促、身體半邊無力、口齒不清、腿腫)。

6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。