



藥物成分

劑型

櫃號

Cinacalcet

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-118

## ☞ 藥品商品名及含量

銳克鈣錠 25 毫克 (Regpara)

鈣易清膜衣錠 25 毫克 (Cinaca F.C.)

## ☞ 藥品作用

治療次發性副甲狀腺機能亢進。

## ☞ 服用方式

1. 一天 1 次，劑量依個人化調整，每次增加劑量時，應間隔至少 2-4 週，請配合醫師指示服藥。未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數。
2. 隨餐或飯後服用。
3. 應整粒吞服，不可分割。
4. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. Regpara 可單獨使用，或與維他命 D、磷結合劑併用。
2. 曾因本藥成分引起過敏者，請勿使用。
3. 若有肝功能不全、心衰竭、心律不整、上消化道出血、癲癇等病史，請事先告知醫師。
4. 若正在服用抗心律不整、抗黴菌或抗憂鬱藥品等，可能存在藥品交互作用，請諮詢醫師/藥師。
5. 為防止兒童誤食請妥善保管。
6. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
7. 服用本藥品需定期回診追蹤血鈣、血磷等檢驗數值，以利劑量調整與監測療效
8. 因本藥品會降低血鈣值，若出現疑似低血鈣之症狀(例：皮膚感覺異常、肌痛、抽筋、抽搐等)，請盡速就醫。
9. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫



10. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。