



藥物成分

劑型

櫃號

Riluzole

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-376

☞ 藥品商品名及含量

銳力得膜衣錠 50mg/錠 (Rilutek)

☞ 藥品作用

治療肌萎縮脊髓側索硬化症，可延長存活時間或延後使用機械呼吸器的時間。

☞ 服用方式

1. 每日 2 次，每次 1 粒，間隔 12 小時服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。劑量增加不能預期療效加強。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有肝腎功能異常或病史之病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 請勿服用含咖啡因產品，會增強此類藥物的藥理作用。
4. 請勿吸菸，吸菸會減少此類藥物的藥理作用。
5. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 服藥期間，請定期監控肝功能。
7. 常見副作用為衰弱、噁心、肝功能數值上升等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發燒、肝炎(食慾不振、噁心、右上腹部疼痛、黃疸)。
9. 本藥禁用於懷孕和授乳期間之女性，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。