



藥物成分

劑型

櫃號

Dolutegravir

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-164

☞ 藥品商品名及含量

汰威凱膜衣錠 50 毫克/錠 (Tivicay F.C.)

☞ 藥品作用


與其他抗反轉錄病毒藥物合併用於治療成人及12歲以上青少年的人類免疫不全病毒(HIV)感染症。

☞ 服用方式

1. 每天服用 1-2 次，遵照醫師處方之用法及劑量服用。
2. 可與食物併服，亦可空腹服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別曾經因 dolutegravir 引起過敏、重度肝腎功能不全以及 B 型或 C 型肝炎等疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥物(dofetilide)、抗病毒藥物(etravirine、efavirenz、nevirapine)、抗癲癇藥物(carbamazepine、oxcarbazepine、phenytoin、phenobarbital)、rifampin、metformin、質子幫浦抑制劑(PPI)、聖約翰草。
3. 避免與含有多價陽離子(如鎂、鋁)的制酸劑、sucralfate、口服鈣或鐵補充劑併用。若需併用應於投予上述藥物或補充品的 2 小時前或 6 小時後服用 dolutegravir。
4. **療程完整性**：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，以達到完全控制病毒複製。
5. 服用此藥並無法阻止病毒經過血液或性行為傳播，請記得確實執行安全性行為，勿共用針頭、牙刷、刮鬍刀等。

- 
6. 常見副作用為：高血糖、血清脂肪酶上升、頭痛、失眠，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
 7. 服藥期間如出現過敏症狀(皮疹、發燒、全身不適、極度疲倦、肌肉或關節疼痛、皮膚起水泡或脫皮、口腔起水泡或損傷、眼睛發炎、臉部腫脹、眼睛/嘴唇/舌頭/口腔腫脹、呼吸困難)、肝臟問題的徵兆與症狀(如皮膚泛黃或眼睛發白、尿液暗沉或呈茶色、糞便呈灰白色、噁心、嘔吐、喪失食慾、或右側肋骨下方出現疼痛、隱痛或敏感的現象)請立即通知醫師/藥師。
 8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示胎兒可能有新生兒神經管缺陷的風險，女性計畫懷孕或已懷孕者請告知醫師。
 9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。