



藥物成分	劑型	櫃號
Orciprenaline/ Bromhexine/ Doxylamine	口服液	
版本：TPE202309 / 櫃號：2023-071		

☞ 藥品商品名及含量 伏咳糖漿 120 毫升/瓶 (Antica Syrup)

☞ 藥品作用

支氣管氣喘，急慢性支氣管炎，肺氣腫，痙攣性氣管炎、支氣管擴張症引起之咳嗽及喀痰。

☞ 服用方式

本藥需由醫師處方使用。通常成人劑量每次口服 10 ml，一日 3 次。小孩 6~14 歲每次 5 ml，一日三~四次，1~6 歲每次 5 ml，一日 2~3 次。

☞ 注意事項

1. 如發生嚴重皮膚損害，須立刻停藥並尋求醫療。
2. 如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。
3. 對其他類交感神經興奮劑有過度過敏反應者，亦可能對本品過敏。
4. Propranolol 會拮抗 orciprenaline 支氣管鬆弛作用。併用其他類交感神經興奮劑會增加 orciprenaline 之副作用。另酒精或 CNS 抑制劑或三環抗鬱劑之併用會增強 doxylamine 或這些藥品本身之作用，併用 MAO 抑制劑時，可能延長 doxylamine 之 Antimuscarinic 作用，故通常不能併用。
5. 以下病症之患者小心投與：心律不整病患有心跳過速情形時、充血性心力衰竭及冠狀動脈疾患、糖尿病、高血壓、甲狀腺機能亢進、青光眼、前列腺肥大；幽門、十二指腸阻塞或膀胱頸阻塞、狹窄性消化性潰瘍。
6. Doxylamine 對人類妊娠之問題雖尚未被證實，不過使用

時必須考慮其危險性和利益。又少量之 doxylamine 會被分泌到乳汁中，而因嬰兒對 antihistamines 有較高之危險性，故不能用於授乳婦人，另外因 doxylamine 具有 antimuscarinic 作用，可能抑制泌乳。

7. 副作用：嗜眠、支氣管分泌變濃、眩暈、胃部不適、胃痛、口中異味感、視力模糊、排尿困難或疼痛、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、心跳加速、臉頰疼痛、神經過敏、多汗、虛弱、不安、肌肉痙攣及血中氨基轉移酶增加。口鼻和喉乾燥、胃口不佳、睡眠麻煩(特別是小孩)、皮膚疹等。
8. 不良反應：
 - (1) 免疫系統疾患：罕見：過敏反應頻率未知：過敏性反應(包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症)。
 - (2) 皮膚及皮下組織疾患：罕見：皮疹、蕁麻疹。頻率未知：嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿皰症)。

☞ 藥品儲存

請儲存於 25°C 以下。