



| 藥物成分 | 劑型 | 櫃號 |
|---------------------------------|------------|----|
| Lopinavir/ Ritonavir | 口服藥 | |
| 版本：TPE202309／檔號：2023-379 | | |

☞ 藥品商品名及含量

快利佳錠劑 200/50 毫克/錠 (Kaletra)。

☞ 藥品作用

治療人類免疫缺乏病毒感染。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每天 2 粒。
2. 可與食物併服或不併服。
3. 需要整粒吞服，不要咀嚼、分開或壓碎錠劑。
4. 請按醫囑確實完成療程頻率及天數及其他併用的抗反轉錄病毒藥物，避免產生抗藥性。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、糖尿病或高血糖、血友病、高血脂症、胰臟炎等疾病及肝功能不良病史。
2. 因本藥與其他藥物有許多交互作用，會增加或減少多種其他藥物的濃度，請務必主動告訴您的醫療團隊您正在使用的所有藥物。若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
3. 可能會降低含雌激素之口服避孕藥或避孕貼片的效果，應指示改用或加上其他避孕方法。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、高三酸甘油酯和高膽固醇血症，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、蕁麻疹或口腔破皮、胸悶、喉嚨緊繃、難以呼吸或說話、呼吸困難、深色尿液、

胸痛、發燒、異常出血。

6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。