



藥物成分	劑型	櫃號
Mitiglinide	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-670		

☞ 藥品商品名及含量

快如妥錠 10 毫克/錠 (Glufast)

☞ 藥品作用

本藥主要用在對無法經由飲食控制及運動達到良好控制的第二型糖尿糖尿病患者，有助於改善餐後血糖。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒。
2. 飯前服用。餐後服用本藥吸收較慢，會減低藥效。為有效降低餐後血糖，應在餐前 5 分鐘內服用，若在餐前 30 分鐘服用，會因為藥物迅速發揮作用，可能會導致用餐開始時血糖過低的狀況。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏。
2. 禁用於重度酮症、糖尿病昏迷或昏迷前期、第一型糖尿病、病人患有嚴重感染、手術前後、嚴重外傷者、已知對本藥物內含之成分過敏者、懷孕或可能懷孕的婦女。
3. 記得索取低血糖衛教單張。常見副作用為低血糖症狀、體重增加、水腫、腹部腫脹、便秘，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。