

藥物成分

劑型

櫃號

**C.B."Strong"
5gm Oint. or the
same formula**

**外用
藥膏**

版本：TPE202309／檔號：2023-081

☞ 藥品商品名及含量

**C.B. Ointment "Strong" 強力施美藥膏每公克含
Chlorpheniramine 10mg、Lidocaine 30mg、Methyl salicylate
10mg、Menthol 10mg、Camphor 5mg。**

☞ 藥品作用

暫時緩解尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

☞ 使用方式

需要時使用，適量塗抹/塗擦於患部。

☞ 注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏、曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：3歲以下、深部皮膚組織感染。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦、要使用於臉部的患者。

☞ 其他注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量或使用次數。
4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
8. 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
10. 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
11. 本藥不可連續使用超過7天。
12. 不得大量使用，以避免全身性吸收，曾有致死報告。
13. 避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。
14. 不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。