



藥物成分

劑型

櫃號

Fenofibrate

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-593

☞ 藥品商品名及含量

脂淨膜衣錠 160 毫克/錠 (Synpid® F.C)

祛脂優錠 160 毫克/錠 (Fenolip-U ®)

弗尼利脂寧 160 毫克膜衣錠 (Lipanthyl Supra 160mg film-coated tablet)

☞ 藥品作用

用來治療高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症、混合型高血脂症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，與主餐併服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良、膽結石、懷孕及授乳的婦女。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服抗凝血藥、Cyclosporin、HMG-CoA 還原酵素抑制劑或其他 fibrates。
3. 建議在初期服藥的第一年，應每三個月做一次肝功能檢測，若肝功能指數超過正常值 3 倍，則須考慮停藥。
4. 若高血脂的病人有併服女性荷爾蒙或避孕藥，其中包含動情激素時，則須追究血脂異常為先天性或續發性(口服動情激素可能會提昇血脂濃度)。
5. 常見副作用為腸胃不適、腹痛、噁心、腹瀉、皮膚紅疹、搔癢、光敏感性，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肌肉疼痛、肌炎、肌肉痙攣、無力。

7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。