



藥物成分	劑型	櫃號
Imiquimod	外用藥膏	
版本：TPE202309／櫃號：2023-627		

☞ 藥品商品名及含量

樂得美乳膏 5% 250mg/小包 (Aldara Cream)

優克寧乳膏 5% 250mg/小包 (Yoou Care Cream)

☞ 藥品作用

治療成人生殖器外部及肛門周圍的尖性濕疣。

☞ 使用方式

1. 一般成人常用劑量為每週使用 3 次，可固定周一、三、五或周二、四、六睡前塗抹。請將雙手洗淨，然後拆開包裝袋，將乳膏擠於指頭上。將乳膏薄塗於潔淨而乾爽的疣患表面，輕輕按摩，直至乳膏完全滲透，不可緊密覆蓋患部。完成後，請以性質溫和的肥皂和水清洗雙手。在塗抹乳膏後，6-10 小時內，請勿洗澡。待 6-10 小時後，應以性質溫和的肥皂和清水潔淨患處。
2. 塗抹乳膏後，請勿以繃帶或其他敷料覆蓋疣患。
3. 塗抹後須減少暴露於自然或人工光源下，需做好防曬措施。
4. 依照醫師指示使用，勿使用過量劑量、次數過多或超過醫師指示的使用療程。
5. 整個療程可至病灶消除或至多 16 周為止。
6. 若忘記塗抹乳膏，應在發現後立即將適量的乳膏塗抹於患處，並繼續原定之療程，在任何情況下，切勿因忘記用藥而將份量加倍。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病 特別是生殖器官皮膚炎/傷口/外科術後患部組織未痊癒、肛門/陰道/尿道內的疣患。
2. 對於未接受割包皮手術的男性，若疣患生於包皮下，應每天掀起包皮清潔，否則可能會引致包皮繃緊。包皮繃緊的

早期現象包括腫脹、破皮或包皮難於掀起。若出現上述情況，應立即停藥並通知醫生。

3. 常見副作用為輕微的皮膚燒灼感、紅腫、疼痛、紅疹、脫皮，類似感冒症狀(包括腹瀉、疲倦、發燒、頭痛、肌肉痛)。但一般都不嚴重，假若患部非常不舒服或發生嚴重的皮膚反應時，可以停用幾天，待皮膚反應消褪後，可再度塗用。若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 本藥無法防止您將致疣的病毒傳染給您的性伴侶，故治療期間，應避免性接觸(性交、肛交或口交)。
5. **如果有下列症狀，請立刻就醫：紅腫、潰瘍、剝落等嚴重皮膚反應。**
6. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。