



藥物成分

劑型

櫃號

Acyclovir

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-011

☞ 藥品商品名及含量

敵庖治錠 400 毫克/錠 (Acylete Tablets)

克庖疹錠 400 毫克/錠 (Acylo Tablets)

☞ 藥品作用

治療帶狀疱疹引起之感染。

☞ 服用方式

1. 成人單純性皰疹

(1) 治療：以 4 小時為間隔，每日 5 次，每次 0.5 粒，治療應持續 5 天。

(2) 抑制復發：以 6 小時為間隔，每日 4 次，每次 0.5 粒；或以 12 小時為間隔，每日 2 次，每次 1 粒。

(3) 預防：以 6 小時為間隔，每日 4 次，每次 0.5 粒。

2. 成人帶狀皰疹：以 4 小時為間隔，每日 5 次，每次 2 粒，治療應持續 7 天。

3. 兒童劑量：2 歲以上兒童應使用成人劑量，2 歲以下兒童應使用成人劑量的一半。

4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是免疫系統疾病、肝腎功能障礙、後天免疫缺乏症候群。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗病毒藥、免疫抑制劑、probenecid。

3. 常見副作用為皮疹、頭痛、疲勞、腹部疼痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏現象(搔癢或蕁麻疹、臉部或四肢腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難)、排尿量或排尿頻率突然變少、皮膚或眼睛變黃。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師 / 藥師。