



藥物成分	劑型	櫃號
Everolimus	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-202		

## ☞ 藥品商品名及含量

癌伏妥錠 5 毫克/錠 (Afinitor)

## ☞ 藥品作用

用於治療停經後晚期乳癌、胰臟神經內分泌腫瘤及晚期腎細胞癌。

## ☞ 服用方式

1. 本藥每日固定時間服用 1 次，每次 1 粒。可與食物併服或空腹服用。
2. 需以整杯水吞服整顆藥錠，不可咀嚼或咬碎。對無法吞服之患者，應將藥錠溶散(約 7 分鐘)於約 30 毫升白開水中，並立即喝下，再加入等量水洗滌並服用完畢。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，在正常服藥時間後六小時內可以補服。若已超過六小時，則應跳過漏掉的劑量，並於隔天原定服藥時間服用 Afinitor。請勿因忘記服藥而一次使用兩倍的劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良、糖尿病、高血脂、B 型肝炎或血球低下。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，特別是 **ketoconazole**、itraconazole、clarithromycin、ritonavir、phenytoin、carbamazepine、rifampin、phenobarbital 及血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)。
3. 服用本藥時，請避免食用葡萄柚或飲用葡萄柚汁。
4. 本藥具有免疫抑制特性，因此病患有可能出現對細菌、真菌、病毒或原生動物之感染，請盡量減少出入公共場合並預防感冒。

5. 治療期間若有疫苗接種需求(如麻疹、腮腺炎、流行性感  
冒疫苗)，請先詢問您的醫師。

6. 常見副作用為**口腔潰瘍**、呼吸道感染、腹瀉、噁心、食慾不振、頭痛、疲倦、皮膚異常及白血球減少，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 以本藥治療的患者可能出現口腔潰瘍、口腔炎及口腔黏膜炎等症狀，若遇到此類情形，建議進行局部治療並**避免使用含酒精或過氧化氫之漱口水**。

8. 如果有下列症狀，請立即就醫：**出現新的咳嗽症狀、咳嗽症狀惡化、呼吸困難、胸痛、發燒、皮膚變黃、起疹、糞便顏色變淡或尿液顏色變深、右上腹疼痛**。

9. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。