



藥物成分

劑型

櫃號

Theophylline

口服液

版本：TPE202309／檔號：2023-774

☞ 藥品商品名及含量

適優喘液 5.34 毫克/毫升 (Centertheo liq.)

舒喘內服液 5.34 毫克/毫升 (Ventol liq.)

☞ 藥品作用

緩解支氣管痙攣。此藥並非用於氣喘急性發作或其他呼吸道症狀之急性發作。

☞ 服用方式

1. 詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
 - (1) 6-12 歲孩童：一次劑量 125-250 毫克，每六小時一次。
 - (2) 成人：一次劑量為 200-250 毫克，每六小時一次。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
3. 避免併服葡萄柚汁或含有咖啡因的飲料(如：咖啡、茶)。
4. 請勿自行停藥或改變劑量，任何劑量調整(尤其是小孩)請洽您的處方醫師。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏(若曾經有 Xanthine 過敏者禁止使用本藥)或是有其他疾病，特別是冠狀動脈疾病、胃潰瘍。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥品，包含保健食品，藥師會幫您評估是否有藥品交互作用。
3. 較常見副作用為噁心、頭痛、失眠、震顫、不安，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嘔吐、心律不整、癲癇。
5. 適優喘液含阿斯巴甜 (Aspartame) 賦形劑，苯酮尿症患者

臺北市立

聯合醫院

(Phenylketonurics) 不宜使用。

6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。