



藥物成分

劑型

櫃號

Bisacodyl

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-062

## ☞ 藥品商品名及含量

明德秘瀉樂腸溶錠 5 毫克/錠

(Bisadyl E.C tablet "MEIDER")

樂可舒腸溶糖衣錠 5 毫克/錠

(Dulcolax enteric sugar coated tablet)

## ☞ 藥品作用

適用於短時間治療便秘或在直腸、大腸檢查或手術前使用，來清除大腸內的糞便。

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1~3 粒，依照醫師指示服藥。
2. 請用開水配服，整粒吞服，與食物及制酸劑隔開 1 小時以上使用。睡前服用或依醫囑指示服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病 特別是胃痛、噁心嘔吐、腸道習慣改變。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(包含非處方藥)，特別是制酸劑、維他命和中藥。
3. 常見副作用為輕微胃痛或不舒服，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：搔癢、臉部手部腫脹、喉嚨口腔腫脹、胸悶、呼吸困難、頭暈、昏厥。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。