



藥物成分	劑型	櫃號
Glyburide/ Metformin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-616		

☞ 藥品商品名及含量

克糖美錠 5/500 毫克 (GlucoMet)

庫魯泛斯錠 5/500 毫克 (GlucoVance)

☞ 藥物作用

本藥為複方，治療第二型糖尿病。

☞ 服用方式

1. 通常初始劑量為每日 1-2 次，每次 1-2 粒，隨餐服用。
2. 醫師會視血糖值做劑量調整，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥請立即補服，但若忘記服藥已超過 3 小時則不要補服。在下次用藥時間服用一次劑量即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**酮酸中毒病史**、高血糖高滲透壓非酮性昏迷、近期曾發生**心肌梗塞**、**腎臟**或**肝臟功能異常**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Miconazole、fluconazole、danazol、phenylbutazone、chlorpromazine、類固醇、利尿劑。
3. **如要接受含碘化物顯影劑的放射性診斷檢查，本藥須在檢查前後 48 小時停止使用。**
4. 服用本藥不得飲酒，酒精會加重副作用產生。
5. 常見副作用為**噁心**、**嘔吐**、**腹瀉**、**腹脹**、**食慾降低**、**低血糖**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 服用本藥可能發生低血糖，可索取**低血糖衛教單張**。
7. **如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重呼吸困難、肌肉疼痛、異常疲倦/腹痛合併噁心嘔吐、心跳變慢或不規則、**

臺北市立

聯合醫院

皮膚發疹或發紅、皮膚或眼睛變黃、大便顏色變淡、尿液顏色變深、不正常出血或瘀青等症狀。

8. 本藥懷孕及哺乳期間都不建議使用，女性計畫懷孕或已懷孕或有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。