



| 藥物成分 | 劑型 | 櫃號 |
|--------------------------|-----|----|
| Valganciclovir | 口服藥 | |
| 版本：TPE202309／檔號：2023-788 | | |

☞ 藥品商品名及含量

克毒癒膜衣錠 450 毫克/錠 (Valcyte F.C.)

☞ 藥品作用

用於治療巨細胞病毒視網膜炎，以及預防接受固體器官移植的病患感染巨細胞病毒。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1-2 次，每次 1-2 粒。
2. 此藥品不可剝半或磨碎，建議與食物一起服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別曾經因 aciclovir、penciclovir、valaciclovir、famciclovir 引起過敏或腎功能不全的人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是骨髓抑制或可導致腎功能受損的藥品，如免疫抑制劑、抗腫瘤劑等。
3. 常見副作用為腹瀉、發燒、噁心嘔吐、頭痛、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化或無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：貧血、呼吸困難、心跳加速、臉色蒼白、不易止血、不明瘀青、持續發燒、口腔潰瘍等非原有疾病之症狀。
5. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
6. 目前對胎兒的風險不明，但動物實驗中有生殖毒性和致畸胎性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。有

鑑於此藥可能具潛在致畸胎性，女性在治療期間及治療後30天內建議採取有效避孕方式，男性於治療期間至治療結束90天內建議實行避孕。

7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。