

藥物成分

劑型

櫃號

Nystatin

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-321

## ☞ 藥品商品名及含量

寧司泰定膠囊 500,000 IU / 膠囊 (Nystatin capsules)

## ☞ 藥品作用

抗黴菌藥，可用於預防及治療腸道念珠菌感染症。

## ☞ 服用方式

1. 口服通常每日 3~4 次，每次 1~2 粒。
2. 用於口腔塗抹時，可將膠囊打開，藥粉粉末直接塗在口腔內，或是少許適量開水混合均勻後，以棉棒沾取藥液塗抹於口腔，塗抹後可以不漱口或是等待數分鐘後再漱口、吞服。
3. 作為漱口水預防或治療口腔感染時，可將膠囊打開，藥粉溶於約 120 毫升的白開水或生理食鹽水後漱口，並停留於口中數分鐘後，依醫生指示吐出或吞下。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為腹瀉、噁心、嘔吐、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚紅疹、蕁麻疹、臉部腫脹、不明原因的肌肉疼痛。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師。