



藥物成分	劑型	櫃號
Buprenorphine/ Naloxone	口服藥	

版本：TPE202309／櫃號：2023-543

☞ 藥品商品名及含量

解佳益舌下錠 2 毫克/0.5 毫克/錠 (Desud Plus SL)

解佳益舌下錠 8 毫克/2 毫克/錠 (Desud Plus SL)

☞ 藥品作用

Buprenorphine 為一鴉片類受體部分促效劑，可減輕戒斷作用，並降低病人對藥物的成癮性及欣快感，長時間使用後可以將成癮病人對藥物的需求降至最低，而添加的 Naloxone 為一鴉片類受體拮抗劑，則使患者更不易產生成癮及欣快感，用於鴉片類物質成癮之替代療法。

☞ 服用方式

1. 根據病人的個體需求調整劑量，治療初始期間，應確保藥片位於舌下，並觀察病人的反應，根據臨床療效進行有效劑量調整。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺功能低下、膽管機能不全、攝護腺肥大、肝、肺、腎功能不良病史。請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是麻醉性止痛劑、benzodiazepines、鎮靜劑、安眠藥或其他中樞神經抑制劑。
2. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
3. 常見副作用為頭痛、失眠、腹痛、便秘、噁心、嘔吐、盜汗，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回

4. 過量使用造成急性中毒，如有下列症狀，請立刻就醫：
針狀瞳孔、嗜眠、低血壓、呼吸抑制。
5. 本藥之懷孕分級：C，若女性計畫懷孕請告知您的醫師；本藥可能會分泌到母乳裡，不建議哺育母乳，有哺乳需求請事先諮詢醫師/藥師。