



藥物成分	劑型	櫃號
Sertraline F.C.	口服藥	

版本：TPE202309／櫃號：2023-393

☞ 藥品商品名及含量

樂復得膜衣錠 50 毫克 (Zoloft Film Coated Tablets 50mg)

憂解膜衣錠 50 毫克 (YOU-JET F.C. Tablets 50mg)

☞ 藥品作用

治療憂鬱症、強迫性官能症、恐慌症、創傷後壓力症候群、社交恐懼症、經前不悅症。

☞ 服用方式

1. 通常一天服用一次。
2. 可與食物或空腹服用。
3. 請遵照處方使用，勿自行增減藥量或停藥。
4. 忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，近兩週內正在服用的藥物(包括非處方藥)，特別是抗凝血劑、抗組織胺藥物、降壓藥物、癲癇、憂鬱症、帕金森氏症、氣喘、肌肉鬆弛劑、鎮定劑、安眠藥、甲狀腺藥物、精神安定劑及注意力不足過動症用藥等。
2. 請告訴醫師您是否有或曾經有青光眼、攝護腺腫大、排尿困難、癲癇、甲狀腺機能亢進、或肝臟、腎臟、心臟疾病。
3. 若您要進行手術(包含牙科手術)，記得告訴醫師或牙醫師您正使用此藥。
4. 此藥可能導致暈眩，請儘可能不要開車或使用危險機械。
5. 酒精會增加此藥的嗜睡作用，服藥期間請勿飲酒。
6. 抽菸可能降低此藥的療效，若您有抽菸，請告訴醫師。
7. Sertraline 常見副作用：胃部不適、嗜睡、虛弱或疲勞、興奮或焦慮、失眠、惡夢、口乾、皮膚比平常對光敏感、胃口及體重的改變。

- 
8. 若下列症狀發生嚴重的情形，請儘快告知醫師：便秘，排尿困難，頻尿，目眩，性功能障礙，下顎、頸部及背部肌肉痙攣，說話速度變慢或困難，來回走動，坐時持續顫抖，發燒、顫抖、喉嚨痛，類似感冒症狀，呼吸困難或吞嚥困難，嚴重皮膚紅疹，皮膚或眼睛發黃，心跳不規則等。
9. 懷孕等級: C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。