



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Latanoprostene bunod</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-265		

## ☞ 藥品商品名及含量

博士倫凡視達眼用液劑 0.024% ( Vyzulta solution)

## ☞ 藥品作用

用於開放性青光眼或高眼壓病人減輕眼內壓。

## ☞ 使用方式

1. 每天使用一次，每次 1 滴，建議在晚間點藥效果最佳。
2. 使用前應取下隱形眼鏡，可於用藥後 15 分鐘再戴上。
3. 使用時，應避免藥瓶滴嘴接觸到眼睛、周圍結構、手指或其他表面，否則可能會導致眼部感染。
4. 若需點兩種以上眼藥水時，請間隔 5 分鐘以上。
5. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加使用次數。若不慎忘記使用，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是眼內發炎狀態、黃斑部水腫、曾經患有虹膜炎、葡萄膜炎。
2. 常見副作用為虹膜色素沉積，會使虹膜顏色改變，通常不會很明顯，不過顏色變化可能為永久性的。虹膜顏色變化明顯者，仍可繼續使用，但應定期回診接受檢查。
3. 睫毛可能變長、變厚、變多，通常停藥後會恢復正常。
4. 未開封的藥瓶應放入 2~8°C 冷藏保存。藥瓶開封後，可在室溫 25°C 以下保存 8 週。
5. 如果有新的眼睛問題(如創傷或感染)、視力急速下滑、接受眼部手術，或發生任何眼部反應(特別是結膜炎和眼瞼反應)時，應立即回診。