



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Risperidone</b>	<b>口服液</b>	
版本：TPE202309／櫃號：2023-732		

## ☞ 藥品商品名及含量

普利思妥內服液 1 毫克/毫升 (Perisdone Oral Sol.)

理思必妥內服液劑 1 毫克/毫升 (Risperdone Oral Sol.)

## ☞ 藥品作用

本藥為抗精神病藥物，能改善思覺失調症的正向症狀，用於治療各種類型之思覺失調症或思覺失調症類似症狀病患及治療具嚴重攻擊性之失智症病人。

## ☞ 服用方式

1. 成人從每日一次，每次 2mg 開始，之後可調整到每日 4~6mg；老年人、體弱病人從每日兩次，每次 0.5mg 開始，之後可調整到每日兩次 1~2mg；失智症患者從每日兩次，每次 0.25mg 開始，之後可調整到每日兩次 0.5mg。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有肝、腎疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為高泌乳血症、增加體重、嘔吐、運動不能，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心律不整、遲發性運動障礙。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。