



藥物成分	劑型	櫃號
Tobramycin	眼用藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-778		

☞ 藥品商品名及含量

點必效眼藥水 3mg/ml 5ml (Tobrex ophthalmic solution)

麥迪森特百欣眼藥水 0.3% 5ml (Tobacin eye drops)

☞ 藥品作用

眼睛感染及眼附屬器官的感染，對於一般抗生素有抗性的細菌感染。

☞ 使用方式

1. 輕微至中等程度的眼睛感染，每四小時於受感染眼睛處滴入 1~2 滴本藥品。
2. 嚴重感染時，每小時於受感染眼睛處滴入 2 滴本藥品，直至明顯見效後，其後慢慢減少用量至完全治癒為止。
3. 臨床試驗證實 Tobramycin 可用於孩童。
4. 使用前請搖動藥瓶，讓藥水混合均勻。
5. 使用兩種眼藥水時，請間隔至少 5 分鐘。
6. 使用兩種眼藥時，先使用藥水再用藥膏，並間隔至少 10 分鐘。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 本藥品不可以注射方式注入眼睛。
3. 不可接觸眼藥水滴出口，以免汙染本藥品。使用完畢或不用時，應鎖緊瓶蓋，以防止汙染。
4. 某些特殊體質患者可能對本藥品具過敏性反應，如有過敏現象，應立即停用此藥。
5. 長期使用本藥品可能引起對本品不具感受性細菌，包含黴菌在內的生長過盛，應注意重複感染的可能性。
6. 使用本藥品同時併用全身性 aminoglycoside 類抗生素時，應小心監測血中濃度。
7. 常見副作用為過敏性反應及眼睛局部性毒性，包含眼瞼癢、

臺北市立

聯合醫院

腫及結膜發紅，若症狀惡化且無法忍受請回診。

8. 懷孕期間不建議使用本眼藥水，除非為非用不可的情況下，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。