



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Chlorhexidine digluconate</b> <b>2mg/gm 50mL</b> <b>Oral</b> <b>bioadhesive gel</b>	外用 藥膏	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-111		

## ☞ 藥品商品名及含量

樂利口抗炎凝膠 (Perioxidin Bioadhesive Gel)

## ☞ 藥品作用

適用於口腔內之殺菌、消毒。

## ☞ 使用方式

1. 使用時，可利用手指或管套沾取適量直接塗抹在牙齦與牙齒之交接處形成保護膜。
2. 每日 2 至 3 次，每次 0.5 至 2 克。
3. 使用後半小時內應避免進食，進食前請您清潔口腔，這是為了避免您食入殘餘藥物。

## ☞ 注意事項

1. 若有下列症狀，請立即就醫：口腔發生刺激感、發炎、或有過敏反應。
2. 本藥不得吞食，並避免接觸外耳道。
3. 長期使用並接觸茶、咖啡、菸、酒等成分之食品，可能造成牙齒變黃，若有相關情形，可尋求牙醫潔牙。
4. 長期使用可能造成暫時性的味覺改變。
5. 請妥善保管本藥，以防止孩童誤食，並存放在常溫乾燥通風處。