



藥物成分

劑型

櫃號

Entecavir

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-580

## ☞ 藥品商品名及含量

欣甘膜衣錠 0.5 毫克/錠(Envir F.C.)

貝樂克膜衣錠 0.5 毫克/錠 (Baraclude F.C.)

貝樂克膜衣錠 1 毫克/錠 (Baraclude F.C.)

## ☞ 藥品作用

用於治療成人及2歲以上兒童之慢性B型肝炎。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 應空腹服用，飯前至少 2 小時及飯後至少 2 小時。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對本藥過敏、腎功能不全、合併人類免疫缺乏病毒及 B 型肝炎病毒感染的病患。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，本藥與已知會影響腎功能的藥物併用時應密切監測有無不良反應。
3. 若患有遺傳性半乳糖耐受性缺乏症、Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖半乳糖吸收不良之病人，不可服用。
4. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，以達到完全控制病毒複製。
5. 停止治療後應定期回診至少數個月，以追蹤肝炎是否惡化。
6. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、消化不良、頭痛、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：蕁麻疹、胸悶、呼吸困難、噁心嘔吐、眼睛或皮膚變黃。

8. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。