



藥物成分	劑型	櫃號
Nordazepam	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-687		

☞ 藥品商品名及含量

納靜膜衣錠 5 毫克/錠 (Nargin F.C.)

☞ 藥品作用

可用來減緩焦慮、緊張，亦可作為安眠、情緒障礙之輔助治療。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2-3 次，每次 1 粒。失眠用為睡前 1 次。
2. 連續服用一段期間之後如需停藥請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀(焦慮、睡不著、易怒)。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，下次用藥時間服藥即可，不可為補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是急性狹角性青光眼、重肌無力症、嚴重呼吸功能不足、癲癇、肝、腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是巴比妥類藥物、鴉片類藥物、精神科藥物。
3. **本藥可能會讓人嗜睡、警覺性及協調能力降低，在沒確定此類藥物對您有何影響前，請勿駕駛或操作危險性機器。**
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
5. 常見副作用為虛弱、頭暈、嗜睡、步態不穩，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：話多、不安、焦慮、亢奮、發抖、肌肉痙攣、意識不清、癲癇、皮膚或眼球變黃。
7. 懷孕禁止使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。