

藥物成分	劑型	櫃號
<b>Emtricitabine</b> <b>+Rilpivirine HCl</b> <b>+Tenofovir Disoproxil</b> <b>Fumarate</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-579		

## ☞ 藥品商品名及含量

安以斯膜衣錠

**Rilpivirine25mg+Emtricitabine200mg+Tenofovir25mg**  
**(Odefsey Film-coated tablets)**

## ☞ 藥品作用

此藥為複方三合一藥物，可以單獨用於治療病毒感染。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，需每日固定時間服用並且和食物併服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師、藥師或個管師是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、精神相關疾病、骨質疏鬆症或曾有骨折、B 型肝炎及肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師、藥師或個管師您是否有在服用其他藥物，如：癲癇藥物、抗肺結核藥物、胃食道逆流或胃潰瘍藥物、口服類固醇藥物。
3. 若併用制酸劑需於服用本藥至少 2 小時之前或 4 小時之後。若併用 H2 接受體拮抗劑需於服用本藥至少 12 小時之前或 4 小時之後。服藥期間請避免服用聖約翰草(St. John's

wort)成分的製品。若空腹服用或只和高蛋白質食物併服可能減少一半的藥效。

4. 常見的副作用為嘔吐、腹瀉、頭痛、眩暈、疲倦、憂鬱疾患、失眠、異常作夢、皮疹、腹痛、骨骼疼痛、肌肉虛弱、體重減輕或紅疹、脂肪重分布(中央型肥胖、頸背脂肪增厚、周邊消瘦、臉部消瘦及乳房腫大)等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚或眼白變黃、嚴重腹痛、肌肉抽搐、茶色尿、灰白色便、異常疲倦(乳酸性酸中毒、肝腫大或肝毒性)、臉部或喉頭紅腫、搔癢、呼吸困難、胸悶、發燒、皮膚呈紫黑色、喘鳴。
6. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。