



藥物成分

劑型

櫃號

Propafenone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-362

## ☞ 藥品商品名及含量

律諾膜衣錠 150 毫克/錠 (Rhynorm F.C. Tablets)

心利正膜衣錠 150 毫克/錠 (Rytmonorm F.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

抗心律不整。

## ☞ 服用方式

1. 成人初始劑量一般為每天 3-4 粒，分二至三次服用，醫師會依據體重及臨床症狀調整劑量。
2. 由於本藥具有苦味及表面麻醉作用，因此須於飯後搭配液體整顆吞服，請勿咀嚼。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能不全、心臟衰竭、心搏徐緩、低血壓、阻塞性肺部疾病、結構性心臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 ritonavir、乙型阻斷劑、三環抗憂鬱劑、口服抗凝血劑(如 warfarin)。
3. 接受使用局部麻醉劑的介入措施(如牙科手術)前，務必告知醫師正在使用本藥。
4. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
5. 本藥可能會讓人產生視力模擬/眩暈/疲勞/姿態性低血壓，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 常見副作用為心跳緩慢、頭暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心律異常、全身痙攣。

8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示本藥會通過胎盤障壁，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師／藥師。