



藥物成分

劑型

櫃號

Ciprofloxacin

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-119

☞ 藥品商品名及含量

信諾隆膜衣錠 250 毫克 (Cinolone F.C.)

喜博欣膜衣錠 250 毫克 (Ciprogen F. C.)

☞ 藥品作用

為Fluoroquinolone類抗生素，抑制細菌DNA合成，用於治療有感受性細菌引起的感染症。

☞ 服用方式

1. 通常每 12 小時服用 1 次，一次 1-3 粒，一般療程約 7-14 天。請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數。
2. 需服用完整治療期間，不可擅自停藥。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 飯前飯後皆可服用。
2. 避免與乳製品、礦物質含量高的飲料(例如牛奶、優格、含鈣果汁)、綜合維生素、鈣片、鐵劑併服，會降低藥效。可於服用 Ciprofloxacin 1-2 小時之前或 4 小時之後使用。
3. 避免與含多價陽離子的藥物、礦物質補充劑、磷聚合物(如：Sevelamer、Lanthanum Carbonate)、Sucralfate、制酸劑或高緩衝性藥物(如：Didanosine 錠劑)等含鎂、鋁或鈣的藥物併用。可於服用 Ciprofloxacin 1-2 小時之前或 4 小時之後使用。
4. 服藥期間請避免攝取大量咖啡因，Ciprofloxacin 會增加咖啡因血中濃度，增加中樞神經刺激效果。

5. 應避免暴露於過量的陽光及紫外線下。若有光過敏作用(如像曬傷般的皮膚反應)產生，須立即停藥並就醫。
6. 對Fluoroquinolone類抗生素(如Levofloxacin、Norfloxacin、Ofloxacin)過敏的患者，對此藥可能有過敏反應，應避免使用。
7. 若正在服用其他抗生素、類固醇、抗凝血劑、化療藥、Cyclosporine、Levofloxacin、Phenytoin、Amiodarone、Theophylline、Probenecid、Tizanidine等，可能存在交互作用，請諮詢醫師/藥師。
8. 腎臟功能不全的患者，應於就診時告知醫師或詢問藥師，可能需要調整用藥方式。
9. 本藥可能會讓人頭暈、疲倦，服用期間請勿開車或操作危險機械。
10. 若有肌鍵處(如：膝蓋、腳踝、肩膀、手肘、手腕)感覺疼痛、腫脹、撕裂感，請立即停用並就醫。
11. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
12. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。