

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

**Elvitegravir/  
Cobicistat/  
Emtricitabine/  
Teonofovir alafenamide**

**口服藥**

版本：TPE202309 / 檔號：2023-181

### ☞ 藥品商品名及含量

捷扶康膜衣錠 150 毫克及 150 毫克及 200 毫克及 10 毫克  
/錠 (Genvoya F.C.)

### ☞ 藥品作用

本藥是一種治療第一型人類免疫缺乏病毒的抗病毒藥，由四種單方藥物組成。

### ☞ 服用方式

1. 每日一次，每次一粒，**隨餐服用**。由於帶有苦味，勿將膜衣錠咀嚼或壓碎服用。使用對象為 12 歲(含)以上且體重至少 35 公斤的成人與青少年；6 歲以上、體重至少 25 公斤且因會發生毒性反應而不適合使用其他療法的兒童。
2. 病況改善也請確實繼續服藥，可避免病毒產生抗藥性，不然療程中吃吃停停會使藥物越來越沒效。如果您有現實的困難無法準時服藥，請與您的醫師/個管師/藥師討論。
3. 忘記服藥之處理：**若未晚於原定服藥時間 18 小時，應盡快伴隨食物補服該次劑量**，下個劑量仍按照原定時間投與；若晚於原定服藥時間 18 小時，則不必補服該次劑量，下個劑量仍按照原定時間投與。
4. 病人若在給藥後 1 小時內嘔吐，需補服一劑。

### ☞ 注意事項

1. 本藥不應與其它抗反轉錄病毒藥品併用。
2. 告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是 **B 型肝炎**、糖尿病、高血脂或者肝腎功能不良。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是良性

前列腺肥大藥物、抗心律不整藥、麥角(ergot)衍生物、降血脂藥、抗精神病藥、肺動脈高壓藥、鎮靜安眠藥、抗癲癇藥、抗結核藥、抗凝血劑、金絲桃及長期使用類固醇和免疫抑制劑等。

4. 本品含單水乳糖，患有罕見遺傳性半乳糖不耐症(全乳糖酵素缺乏症)或葡萄糖-半乳糖吸收不良的病人，不應使用本藥。
5. 本藥與制酸劑、含有多價陽離子(如鎂、鋁、鈣、鐵、鋅)之藥品或綜合維生素的服用時間宜錯開 4 小時。
6. 常見副作用為噁心、腹瀉、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：關節疼痛、關節僵硬或活動困難等症狀。
8. 服用本藥期間請特別留意肝功能變化，若有異常疲累、尿液顏色變深等情形請就醫，並告知正在服用本藥。
9. 服用本藥期間，應採取有效避孕措施。
10. 懷孕期間不建議使用本藥，若有計畫懷孕或已懷孕，請告知醫師及藥師。
11. 對新生兒及嬰兒的作用，目前尚無充分資料，為避免傳染病毒給嬰兒，不應哺乳。