

藥物成分

劑型

櫃號

Chlorpheniramine

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-113

☞ 藥品商品名及含量

第一項商品未決標

舊商品：(暫)敏達錠 4毫克/錠 (Benda)

☞ 藥品作用

緩解過敏性鼻炎、流鼻水、打噴嚏、搔癢、皮膚癢疹等症狀。

☞ 服用方式

1. 通常一日 3~4 次，一次 1 粒，每次間隔 4 小時以上服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 曾因本藥成分引起過敏者，請勿使用。
2. 若有嚴重代謝性肝腎疾病、呼吸道疾病、青光眼、前列腺肥大引起排尿困難等疾病，請告知醫師。
3. 若正在服用感冒藥、過敏藥、抗憂鬱、抗癲癇、鎮定劑、安眠藥、肌肉鬆弛劑、麻醉性止痛藥等，請告知醫師。
4. 本藥可能會讓人嗜睡、警覺性及協調能力降低，**服用期間請勿開車或操作危險機械。**
5. 服藥期間**避免飲酒**，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
6. 為防止兒童誤食請妥善保管。
7. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
8. 如不慎過量使用或吞服後，感覺不適者，請立即停用並就醫。
9. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
10. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。