

藥物成分

劑型

櫃號

Fusidate
Sodium

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-607

☞ 藥品商品名及含量

服舒清膜衣錠 250 毫克/錠 (Fusodate F.C.)

服即淨錠 250 毫克/錠 (Fucidin)

☞ 藥品作用

本藥品為抗生素，用於治療革蘭氏陽性菌及葡萄球菌引起的感染症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2~3 次，每次 1~2 粒。
2. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝功能不全**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血脂 **statin** 類藥物、治療人類免疫缺陷病毒之**抗病毒藥**、抗凝血藥物 **warfarin**。
3. 常見副作用為消化不良、噁心、嘔吐、腹瀉，但一般都不嚴重，餐時服用則可避免；若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**過敏反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀)**、肌肉無力、皮膚搔癢或眼白變黃、深茶色尿等。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，**孕期最後三個月應避免使用本藥**，女性計畫懷

臺北市立

孕或已懷孕請告知您的醫師。

6. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/
藥師。