



藥物成分	劑型	櫃號
Valacyclovir	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-787		

☞ 藥品商品名及含量

庖易剋膜衣錠 500 毫克/錠 (Vacyless F.C.)

祛疹易錠 500 毫克/錠 (Valtrex)

☞ 藥品作用

帶狀庖疹、復發性生殖器庖疹的預防及治療。

☞ 服用方式

1. 治療帶狀庖疹：通常一日 3 次，每次 2 粒，持續 7 天。
2. 治療單純庖疹：通常一日 2 次，每次 1 粒。
3. 預防單純庖疹復發：通常一日 1 次，每次 1 粒。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因 **valacyclovir** 或 **aciclovir** 引起過敏或腎功能不全的人。
2. 使用本藥期間，應特別注意確保適當的水分攝取，尤其是老年人。
3. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
4. 常見副作用為頭痛、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：運動失調、尿量急遽減少、起疹、血管性水腫、呼吸困難、昏迷、幻覺等。
6. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥的主要代謝產物會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。