



藥物成分	劑型	櫃號
Norethisterone	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-318		

☞ 藥品商品名及含量

信通糖衣錠 5 毫克/錠 (Shiton)

諾莉娜錠 5 毫克/錠 (Norina)

☞ 藥品作用

可治療無月經、經前症狀、調經，或因荷爾蒙不平衡所造成的子宮異常出血。

☞ 服用方式

1. 請依照醫師處方服用，通常每天 2 次，每次 1 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾患乳癌、子宮內膜癌、有肝臟疾病或肝功能不良、深部靜脈血栓、血栓性疾病(中風)等疾病患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：巴比妥類藥品，抗癲癇藥品，rifampicin 等。
3. 建議避免吸菸，吸菸會增加心血管事件(血栓)的風險。
4. 常見副作用為噁心、頭痛、水腫、子宮/陰道出血，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：第一次發生偏頭痛或經常發生不尋常嚴重的頭痛、足部腫脹或有灼熱/壓痛感、胸部感覺疼痛或緊繃、突發性呼吸急促、全身發癢、血壓顯著升高、憂鬱。
6. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。