



藥物成分

劑型

櫃號

Pramipexole

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-711

☞ 藥品商品名及含量

樂伯克持續性藥效錠 0.375 毫克/錠 (Mirapex PR tab)

樂伯克持續性藥效錠 1.5 毫克/錠 (Mirapex PR tab)

☞ 藥品作用

本藥用來治療巴金森氏症的徵候及症狀。

☞ 服用方式

1. 本藥的起始劑量為 0.375mg，一天一次，空腹用藥或與食物併用，若出現噁心症狀，將 Mirapex PR 錠劑與食物一起服用，可能有助減少噁心的發生。
2. 醫師會依您的狀況而調整劑量，請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意自行增減藥量或是停藥。
3. 若忘記服藥，錯過一劑藥物，請勿將下一劑劑量加倍。

☞ 注意事項

1. 此錠劑必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是左多巴/多巴脫羧基酶抑制劑，胃藥及抗精神病藥物。
3. 使用樂伯克會有鎮靜作用，對駕車、操作重機械或其他危險活動可能會造成影響，宜盡量避免。
4. 服用此藥可能會有直立性低血壓，因此需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，如此可避免頭暈及跌倒。
5. 常見副作用為姿勢性低血壓、便秘、噁心、嗜睡、失眠、幻覺、運動困難，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心臟衰竭、肌痛、衝動控制症狀。
7. 不排除此藥物是否具有致畸胎，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。