



藥物成分

劑型

櫃號

**Polyethylene  
Glycol 4000**

**懸液用  
粉劑**

版本：TPE202309／檔號：2023-354

## ☞ 藥品商品名及含量

腹樂疏口服懸液用粉劑 10 克/包 (Forlax)

寶淨口服懸液用粉劑 10 克/包 (Bowlax)

## ☞ 藥品作用

治療便秘。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。


## ☞ 服用方式

1. 每日 1 至 2 包，建議於上午服用單次劑量，服藥後二十四至四十八小時可見功效。
2. 每包需先溶解於常溫冷水約 50-100 毫升後口服使用。
3. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。

## ☞ 注意事項

1. 服藥前請先告知您的醫師，是否對此藥過敏或是有下列疾病如腸穿孔或有腸穿孔危險、嚴重發炎性腸症、腸癱瘓或懷疑腸阻塞、原因不明的腹痛症狀等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 digoxin、抗癲癇藥物、coumarins 及免疫抑制劑。
3. 本藥含有山梨糖醇，患有果糖不耐症之病人不得服用。
4. 腹樂疏可能減少其他藥物的吸收，因此須與其他藥物間隔至少兩小時。
5. 常見副作用為腹痛、腹脹、腹瀉、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏性休克、血管水腫、

臺北市立



蕁麻疹、

皮疹、搔癢、紅斑。

7. 女性哺乳、計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。