



藥物成分	劑型	櫃號
Levetiracetam	口服液	

版本：TPE202309／檔號：2023-649

## ☞ 藥品商品名及含量

優閒內服液劑 100 毫克/毫升 300 毫升/瓶 (Keppra Oral Solution)


樂閒 內服液劑 100 毫克/毫升 (Levim Oral Solution 100 mg/ml)

## ☞ 藥品作用

16歲以上病患之癲癇局部發作（併有或不併有次發性全身發作）的單獨治療。

## ☞ 服用方式

1. 本藥須由醫師處方使用。
2. 本藥可與水併服，飯前或飯後服用均可。盒內附有具刻度之量器。建議每日劑量平均分早、晚兩次使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

使用方法	藥品外觀
用附的針管吸取適當劑量	

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對主成分 levetiracetam 或其他賦形劑敏感者，請勿使用本藥。
2. 本產品含有麥芽糖醇液體，因此有罕見之果糖不耐性遺傳問題的病患不可使用。

3. 本產品含有甘油，可能會引發頭痛、胃部不適與腹瀉。
4. 常見副作用為鼻咽炎、睏倦、頭痛、疲勞與暈眩，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. **如果出現憂鬱症及/或自殺意念或行為，請立刻就醫。**
6. 懷孕等級 C，除有明確必要外，不建議懷孕婦女與具有生育能力但未避孕的婦女使用本藥。本藥會分泌到母乳裡，故不建議授乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。