

藥物成分

劑型

櫃號

Olaparib

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-323

## ☞ 藥品商品名及含量

令癌莎膜衣錠 150 毫克 (Lynparza)

## ☞ 藥品作用

用於乳癌、上皮卵巢癌、輸卵管腫瘤或原發性腹膜癌等治療。

## ☞ 服用方式

1. 建議劑量為每次 2 粒，每日 2 次，隨餐或空腹服用。
2. 請完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎、溶解或剝半。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 itraconazole、clarithromycin、ketoconazole、voriconazole、phenytoin、rifampicin、carbamazepine。
3. 治療期間，避免食用葡萄柚、葡萄柚汁、苦橙和苦橙汁。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、味覺障礙、疲勞、肌肉疼痛等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，在治療期間及接受最後一劑後 6 個月內需使用有效避孕措施。
6. 男性病人在治療期間及接受最後一劑後 3 個月內，不應捐贈精子，且其女性伴侶建議使用有效避孕措施。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間到最後一劑後 1 個月內，不建議哺乳。