

藥物成分

劑型

櫃號

**Losartan /
Hydrochlorothiazide**

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-282

☞ 藥品商品名及含量

好悅您膜衣錠 100/12.5 毫克、50/12.5 毫克 (Hyzaar)

心舒壓膜衣錠 50/12.5 毫克 (Losarzide)

☞ 藥品作用

治療高血壓。

☞ 服用方式

1. 通常起始劑量為每日 1 次，每次 1 粒，後續可依病情依據醫師指示調整劑量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是無尿症者、高尿酸血症、肝腎功能不佳、電解質不平衡、懷孕或預備懷孕、哺乳、磺胺類成分過敏史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑、磺胺類藥物。
3. 常見副作用為姿勢性低血壓、高血鉀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 本藥品可能引起姿勢性低血壓，當變換姿勢時宜緩慢。
5. 如長期使用含高鉀的飲食 (如低鈉鹽、香蕉、柑橘類等高鉀水果)，須先請教醫師。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：腹瀉、嘔吐、全身無力、臉舌手腳發麻、心律不整、痛風發作。
7. 資料顯示，若於懷孕第二、三期時服用本藥品，會影響發育中胎兒，甚至導致死亡，故懷孕後須儘快停用本藥品。



8. 本藥品可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。