



藥物成分

劑型

櫃號

Pemigatinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-464

## ☞ 藥品商品名及含量

達伯坦錠 9 毫克/錠 (Pemazyre)

## ☞ 藥品作用

適用於成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有FGFR2融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性膽管癌。

## ☞ 服用方式

1. 建議劑量為 13.5 毫克，每日口服 1 次，連續服用 14 天，接著停藥 7 天，整個週期為期 21 天。
2. 可與食物併服或不併服，請每天大約於同一時間服藥。請整顆吞服。請勿壓碎、咀嚼、切開或溶解錠劑。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，您可以在同一天的 4 小時內補服錯過的劑量；但若超過 4 小時或更久的時間，或出現嘔吐，在下次用藥時間服藥即可，不可服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
2. 常見副作用為掉髮、疲勞、指甲疾病、腹瀉、噁心嘔吐、味覺改變、背痛、關節痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：眼睛問題(視線模糊、閃光或看見黑點等)、高磷酸鹽血症(肌肉痙攣、麻木或嘴周刺痛等)。

## ☞ 其他注意事項

1. 目前尚無用於孕婦之臨床資料，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
2. 若您是具有生育能力的女性，服藥期間以及接受完最後

一劑後 1 週內，請使用有效的避孕措施。

3. 男性病人的女性伴侶若具有生育能力，服藥期間以及接受完最後一劑後 1 週內，請使用有效的避孕措施。

4. 目前尚無 Pemazyre 或其代謝物在人類乳汁，或對哺乳兒童或乳汁分泌影響的資料，由於可能對哺乳兒童造成嚴重不良反應，在服藥期間以及接受完最後一劑後 1 週內不建議哺乳。