



藥物成分

劑型

櫃號

Tofacitinib

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-779

## ☞ 藥品商品名及含量

捷抑炎持續性藥效錠 11 毫克/錠 (Xeljanz XR)

## ☞ 藥品作用

調節體內的免疫反應，用於治療類風濕性關節炎、乾癬性關節炎及潰瘍性結腸炎。

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒，空腹或與食物併服皆可。
2. 不可壓碎、剝半或咀嚼。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是感染以及肝腎功能不全、癌症、肺結核、腸胃疾病等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗結核藥(如:rifampin)、抗黴菌藥(如:fluconazole、ketoconazole)以及其他免疫抑制劑(如:azathioprine、tacrolimus cyclosporine)。
3. 用藥期間請避免施打活性疫苗。
4. 請平時做好保健措施(如:洗手、戴口罩)，避免受傷與感冒。
5. 常見副作用包括鼻咽炎、頭痛、上呼吸道感染、腹瀉、膽固醇濃度上升等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 服藥期間如果出現感染的徵兆及症狀如血便、血尿、不正常出血、胸痛、發燒、喉嚨痛等，請立刻就醫。

臺北市立

7. 孕婦使用本品的現有資料不足以確立具有重大結果相關的藥物風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。