



藥物成分	劑型	櫃號
Amisulpride	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-518		

☞ 藥品商品名及含量

樂彼來錠 200 毫克/錠 (Ribelite)

首利安錠 200 毫克/錠 (Solian)

☞ 藥品作用

用於治療精神疾病，特別是急性或慢性的思覺失調症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 至 2 次，每次 1 至 2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是糖尿病、高血壓、癲癇、腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥物、巴金森氏症用藥、其他精神疾病相關藥物。
3. 本藥在開始服藥期間，若出現不明原因發燒或非預期性感染，應立即就醫進行血液學檢查。
4. 常見副作用為顫抖、僵硬、激躁不安、乳房腫脹、體重增加、便秘，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：抗精神病藥物惡性症候群(高燒、肌肉僵硬、意識改變、心跳不規則、發汗)。
6. 有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。