



藥物成分	劑型	櫃號
Mesalazine	肛門 栓劑	
版本：TPE202309／櫃號：2023-290		

☞ 藥品商品名及含量

頗得斯安栓劑 1 公克/粒 (Pentasa Suppositories)

安腸克栓劑 500 毫克/粒 (Asacol Suppositories)

☞ 藥品作用

屬於抗發炎藥，用於治療潰瘍性結腸炎、局部性迴腸炎所引起之相關症狀，如腸道發炎、腹瀉及腹痛等

☞ 使用方式

1. 頗得斯安栓劑通常一日 1-2 次，每次 1 粒，亦可分次給予。
安腸克栓劑通常一日 3 次，每次 1-2 粒。
2. 建議使用前請先如廁，先將包裝打開，將栓劑塞入直腸直到感覺有阻力為止。為幫助更容易塞入直腸，可以搭配水或潤滑劑使用。如果頗得斯安栓劑在塞入 10 分鐘內排出，可以投予另 1 粒。
3. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加次數。若不慎忘記，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經對水楊酸過敏者、腎功能不佳。
2. 常見副作用為頭痛、腹瀉、噁心、嘔吐等現象，但一般都不嚴重，塞入本劑後，可能對直腸會產生些許局部反應：如搔癢、直腸不舒服及壓迫感。若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發生急性不耐症如腹絞痛、急性腹痛、發燒、劇烈頭痛、皮疹、過敏反應及藥物熱。
4. 治療期間，請定期監控腎功能。
5. 發炎性腸道疾病的病人有發生腎結石的風險，此藥曾有腎

結石案例。治療期間必須確保攝取充分的液體。

6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，需留意腸炎疾病本身可能增加懷孕時的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。