



藥物成分	劑型	櫃號
Nifedipine	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-685		

☞ 藥品商品名及含量

壓達能軟膠囊 5 毫克/膠囊 (Atanaal)

壓悅達持續性藥效錠 30 毫克/錠 (Adapine S.R)

恆脈循持續性膜衣錠 30 毫克/錠 (Nifedipine S.R.)

☞ 藥品作用

1. 狹心症 2. 高血壓。

☞ 服用方式

1. 軟膠囊劑型通常一日 3 次，每次 1 到 2 粒，可刺破或咬破後吞服以達速效。

2. 持續釋放之緩釋劑型通常一日 1 次，每次 1 到 3 粒，需整粒吞服，不可嚼碎/剝半/或研磨。

3. 醫師可能依照您的臨床症狀調整使用頻率和劑量，請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘記服藥，請立即補服，但若已接近下次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告知您的醫師，是否有藥品過敏史及您目前正在服用的其它藥物，特別是β阻斷劑、巨環類抗生素、口服抗黴菌藥物或 rifampicin、cimetidine 等。

2. 如果您有或曾經有肝臟疾病，應告知您的醫師。

3. 服藥期間**請避免服用葡萄柚或葡萄柚汁**。

4. 如果您將進行手術(包含牙科手術)，記得告訴醫師或牙醫師您正在使用的藥物。

5. 常見副作用為水腫、頭痛、暈眩、嘔吐等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 若您有下列任一症狀：過敏反應(搔癢、蕁麻疹、喉頭腫脹)或**低血壓、胸痛、心跳不規則、異常出汗、昏厥、噁心嘔吐**等持續數日或逐漸惡化時請立即就醫。

臺北市立

7. 本藥在臨床醫師評估風險利益後可使用於孕期，服藥期間亦可能會分泌到乳汁中，惟嬰兒風險小，女性計畫懷孕/已懷孕/有哺乳需求，請事先諮詢醫師/藥師。