

藥物成分

劑型

櫃號

Estradiol

外用藥膏

版本：TPE202309 / 檔號：2023-584

☞ 藥品商品名及含量

麗露凝膠 0.6 毫克/克，30 克/軟管 (Ladiol Gel)

☞ 藥品作用

可治療因疾病、手術或自然停經引起之停經症候群或其他荷爾蒙缺發引起的症狀，是種荷爾蒙替代療法。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 使用方式

1. 麗露凝膠是種由皮膚吸收的藥品，須每天同一時間使用，建議於夜間洗完澡後，塗抹在身體乾淨無毛髮的大面積皮膚上(例如腹部、大腿內側)，**須注意不可塗抹在乳房、陰道或毛髮處。**
2. 每次塗抹的量請依醫師指示，一般是建議每日使用 2.5 克凝膠，可使用內附的計量尺，將凝膠均勻擠在凹槽的長度即為 2.5 克；通常使用三周後會停藥一周作每月循環使用。

請將藥膏擠出此長度



計量尺



☞ 注意事項

1. 使用前後請洗手，並避免幼兒及寵物接觸到此藥物。
2. 請告訴醫師或藥師是否有藥物過敏或其他疾病，特別是乳癌(或家族史)、子宮內膜癌或其他惡性腫瘤、血液栓塞疾病(如深層靜脈栓塞)、紅斑性狼瘡、高血脂症或胰臟炎。
3. 使用期間如有發現不正常的陰道出血 (超過正常時間或持續點狀出血)、乳房脹痛或有硬塊、噁心、頭痛或視力

模糊時，應立即回診請醫師評估。

4. 保存請放陰涼處，勿冷藏或冷凍。

5. 使用此藥品對胎兒可能不安全，女性若有生育計劃請告知醫師；服用本藥期間不建議哺餵母乳。