



藥物成分

劑型

櫃號

Sorafenib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-755

☞ 藥品商品名及含量

蕾莎瓦膜衣錠 200 毫克/錠 (Nexavar F.C.)

索福耐膜衣錠 200 毫克/錠 (Sorafenat F.C.)

☞ 藥品作用


本藥為抗腫瘤標靶藥物，可阻斷訊息傳遞進而抑制血管新生及癌細胞生長，用於治療肝細胞癌、晚期腎細胞癌與分化型甲狀腺癌。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 2 粒，空腹(用餐前 1 小時或是用餐後 2 小時)整粒吞服，不可以與食物一同服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對藥物過敏或是有其他疾病；尤其是有心臟病史、冠狀動脈疾病、高血壓、肝功能異常、甲狀腺功能低下、近期動過手術或傷口癒合不佳。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是肺結核藥物(如: rifampin)、抗癲癇藥物、心律不整藥物、抗凝血藥物 warfarin、聖約翰草等。
3. 藥物可能影響傷口癒合，建議非緊急手術前 10 天內、重大手術後 2 週內或傷口未完全癒合之前，暫停使用本藥。
4. 常見副作用為疲倦、感染、體重減輕、食慾減退、皮疹、手足皮膚反應、掉髮、腹瀉、噁心、胃腸道及腹部疼痛、高血壓和出血，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：極罕見的嚴重皮膚不良反



應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)、持續且無法控制的高血壓、出血症狀(黑便、暗褐色尿液、咳血、嚴重腹痛、出血不止或瘀青)。

6. 懷孕等級 D，懷孕婦女使用本藥可能會造成胚胎的傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，服藥期間以及停藥後至少 2 個星期應維持有效的避孕措施。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。