



藥物成分	劑型	櫃號
Oxcarbazepine	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-691		

☞ 藥品商品名及含量

除癲達膜衣錠 300 毫克/錠 (Trileptal F.C)

癲合膜衣錠 300 毫克/錠 (Neurtrol F.C.)

☞ 藥品作用

穩定神經膜及抑制神經傳導物質釋放，可治療癲癇之單一或輔助治療，本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師/藥師。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒。
2. 藥錠有刻痕，可以折斷為二半，使患者更易於吞嚥藥錠。
3. 請照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇、肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥、抗肺結核藥 rifampin、抗病毒藥 rilpivirine、減肥藥 orlistat、口服避孕藥或其他荷爾蒙替代療法。
3. **本藥可能會讓人暈眩、嗜睡、導致警覺性及協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用
5. 常見副作用為皮疹、頭痛、視力模糊、噁心、嘔吐、低血鈉、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。

臺北市立

7. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。