



藥物成分	劑型	櫃號
Hydromorphone HCl	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-471		

☞ 藥品商品名及含量

口服藥：**釋通緩釋錠 8 毫克(Jurnista 8mg OROS Tab)**

☞ 藥品作用


解除癌症末期病患之嚴重疼痛。

☞ 服用方式

1. 適用於已使用口服 morphine，且劑量已達穩定（不再變動）至少二週，而有更換其他鴉片類藥物止痛需求的病患。本商品對口服 morphine 之劑量為 1：5 方式做轉換。
2. 每天於固定時間服用一次，每次一粒，每次需配一杯水，切勿咀嚼、分錠或壓碎。
3. 每 24 小時不應服用超過一次以上。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有亞硫酸鹽過敏、藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾因手術及/或潛在疾病而使胃腸道變窄、或有盲管(blind loops)、腸胃道阻塞、持續性氣喘、頭部創傷、遺傳性乳糖不耐症或肝腎功能不全的病患。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)、嗎啡致效劑或拮抗劑(例如 **buprenorphine、nalbuphine 或 pentazocine**)、中樞神經鎮靜藥物如安眠藥、鎮靜劑、全身麻醉劑、抗精神病藥物。
3. 酒精:酒精會增強此藥的鎮靜作用。
4. 常見的藥物副作用：口乾、頭痛、嗜睡、暈眩、乏力、便秘、噁心、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、嗜睡、意識狀況的改變。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

- 
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。
 8. 本藥不應突然停藥，鴉片類藥物的停用或戒斷症狀特性包含下列部分或全部：坐立不安、流淚、流鼻涕、打呵欠、流汗、打冷顫、毛髮豎立、肌痛、瞳孔放大、燥動、焦慮、背痛、關節痛、虛弱、腹部痙攣、失眠、噁心、厭食、嘔吐、腹瀉、或血壓、呼吸速率及心跳的增加。
 9. 由於本藥在腸胃道中僅會吸收水分而變軟，而不會有重大變型乃至崩解，避免一次同時服用多顆。
 10. 病人若發現在糞便中含有狀似 Jurnista[®] 錠劑的東西毋需擔憂，因其僅為非可溶性的藥殼。