



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Amiodarone HCl</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202310 / 檔號：2023-021		

## ☞ 藥品商品名及含量

**臙得樂錠 200 毫克/錠 (Cordarone)**

**艾達絡錠 200 毫克/錠 (Adarone)**

## ☞ 藥品作用

治療心房撲動、心房纖維顫動、心室纖維顫動等心跳過快的異常狀態。

## ☞ 服用方式

1. 常用劑量每日 3 次，一次 1 粒
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾患甲狀腺疾患、呼吸困難乾咳、肝臟疾病、神經肌肉症狀、視力減退、低血鉀症狀、心臟傳導阻滯問題、曾經因心跳過慢暈倒:心因性休克。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥物(sotalol、quinidine)、抗精神病藥物(chlorpromazine、thioridazine、amisulpride)、抗黴菌藥品(ketoconazole、posaconazole)、QT 波延長藥物(fluoroquinolone)、容易引發低血鉀藥物(利尿劑)、影響心搏藥物(diltiazem、verapamil)、抗排斥用藥(cyclosporin)、抗凝血藥(warfarin、phenytoin)、digoxin、CYP3A 受質(colchicine、triazolam、simvastatin)。
3. 本藥可能會引起中樞神經系統反應或視線模糊，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

- 
4. 麻醉：如有要進行麻醉，請事先告訴醫師或麻醉師您正在服用此藥。
  5. 葡萄柚汁：服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
  6. 光敏感：可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
  7. 常見副作用為腸胃失調、肝指數異常、光敏感性、視覺模糊、睡眠異常、心搏徐緩、甲狀腺功能異常等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
  8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重呼吸衰竭病人支氣管痙攣(呼吸困難、呼吸窘迫症)、心律不整發作或惡化、視神經炎可能導致失明、神經運動失調、再生不良性貧血、血小板減少症(凝血功能異常)。
  9. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
  10. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。